

75) マルミ(丸実)ノアブラシメジ(新種)。傘は中心部帯褐色、周辺部帯オリーブ黄色。茎は帯オリーブ黄色。ヒダは最初黄色後ニッケイ色となる。胞子は広卵形ないし類球形でいぼにおおわれる。近江瀬田町及び大津市石山平津町のマツ林内に生ずる。

76) コキイロ(濃色)ウラベニタケ(新種)。暗紫褐色の小一中形菌で6, 7月頃芝生上に多数発生する。大津市田上黒津町で採つた。

77) ヒメシロウラベニタケ(新種)。非常に小形で、全体ほぼ白色、脆弱。11月頃、大津市石山平津町のヒノキ植林内に発生する。

		正 誤 (32 巻)	Errata for Vol. 32 (1957)
page	line	誤 for	正 read
141	下から 11	and 29,	and 29, 1955;
142	1	volve	volva
143	1	granulas	granular
"	13	bone-shaped	bone-shaped
144	7	<b>Psilocybe</b>	60) <b>Psilocybe</b>
"	9	oliue-brown	olive-brown
145	8	cystidio	cystidia
146	6	va.	var.
"	19	コナラカラカサタケセドキ	コナラカラカサタケモドキ
208	9	glabso	glabro
210	下から 7	to the stem	on the stem
213	8	iinterdum	interdum

33 巻 1 号 Vol. 33 No. 1 (1958)

11	下から 5	宮崎県	鹿児島県
24	16	ウダイカ, ソバ	ウダイカンバ,
"	26	ムラサキヤシオ, ツツジ,	ムラサキヤシオツツジ,
26	13	シラネアザミ	シラネアオイ
28	3	メヤマキンボウゲ	ミヤマキンボウゲ
"	下から 2	prllescenti	pallescenti
30	8	<i>Chirta</i>	<i>Chirita</i>
"	下から 3	<i>surea</i>	<i>aurea</i>